

Țânțari și vremea ploioasă, cazuri de West Nile

Dana Lascu / 26 iul 2018 / 14:57



Descriere foto:

Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a anunțat că în România, până la 24 iulie 2018, confirmate oficial 5 cazuri de infecție cu virusul West Nile. Deocamdată, din fericire, niciun deces. În mai multe țări din Europa crește, însă, numărul cazurilor.

Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, din subordinea Institutului Național de Sănătate Publică, cazurile confirmate au fost înregistrate la persoane de gen masculin. În funcție de județul de expunere, cazurile înregistrate în: Dolj - 2 cazuri; Brăila, Olt și Iași câte un caz.

În țările din jurul nostru, și mai multe

DSP Bihor arată, însă, că până la data de 19 iulie, au fost confirmate 17 cazuri de infecție cu virus West Nile în țări ale Uniunii Europene: Grecia (12), Italia (4) și Ungaria (1), precum și alte 29 de cazuri în Serbia (în județe din Banatul de vest, la granița cu România).

Situația meteorologică actuală din România este propice dezvoltării vectorilor: ploi urmate de perioade de încălzire preinundații în unele zone din țară.

Director executiv al DSP Bihor, DR. Daniela Rahotă spune că „la nivel comunitar, autoritățile administrației publice locale, orașe și municipii trebuie să aplice ferm și eficace măsurile pentru combaterea și controlul populației de țânțari în lacuri, bălți și zone cu risc (rurale) și asanarea subsolurilor inundate, dezinsecția zonelor cu parcuri și spații verzi, în locații urbane”.

Cum te poți feri de infecție

La nivel individual, ea recomandă fiecărui cetățean să facă următoarele lucruri pentru a se proteja de înțepăturile țânțarilor care transmit virusul West Nile:

- *evitarea expunerii la țânțari*, mai ales în aer liber în amurg și în zori când țânțarii sunt mai activi, prin purtarea de îmbrăcăminte lungi și pantaloni lungi,
- *utilizarea substanțelor chimice care resping țânțarii* (aplicate cutanat și/sau ambiental),
- *împiedicarea pătrunderii țânțarilor în locuință* (prin montarea de site la ferestre, uși),
- *desecarea bălților de apă din jurul gospodăriilor și îndepărtarea recipientelor cu apă stătută* (butoaie cu apă, vase, vaze, flori, etc., care permit înmulțirea țânțarilor). Se va schimba des apa din vasele pentru adăpatul animalelor, evitându-se s

Simptomatologia și transmiterea infecției cu virusul West Nile

Virusul este transmis prin mușcătura țânțarilor infectați. Infecția nu se transmite prin atingerea unei persoane infectate. eficientă metodă de prevenire este evitarea înțepăturilor de țânțari. La apariția simptomelor de boală, pacienții trebuie adreseze medicului, evitând să se trateze singuri. Virusul West Nile afectează sistemul nervos central.

- 80% din persoanele infectate nu prezintă niciun fel de simptome.
- 20% au simptome ușoare: febră, cefalee, grețuri, vărsături, erupție cutanată, inflamarea ganglionilor.
- Numai 1 din 150 persoane dezvoltă forma severă a bolii cu febră mare, cefalee, dezorientare, meningită până la comă
- Sunt afectați mai ales copiii și vârstnicii cu rezistență scăzută.